

# СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ

## ЭКЗАМЕН

# Доврачебную медицинскую помощь оказывают в очагах катастроф в течение первых

- + 30 минут
- 50 минут
- 1 час и более

# В состав аптечки индивидуальной (АИ-2) не входит:

- цистамин
- + пантоцид
- противорвотное средство

# В мирное время существует система эвакуации:

- + двухэтапная
- трехэтапная
- четырехэтапная

# Продолжительность скрытого периода ОЛБ:

- 2 месяца
- 5-6 недель
- + до 5 недель

# Зарин, зоман относятся к ОБ:

- слезоточивого действия
- + нервно-паралитического действия
- общеядовитого действия

# Хлор - это:

- бесцветный газ с запахом прелого сена
- газ без цвета и запаха
- + желто-зеленый газ с удушающим запахом

# РСЧС строится по:

- + территориально-производственному принципу
- районно-городскому принципу
- деревенско-сельскому принципу

# По принципу действия противогазы бывают:

- отталкивающие
- всасывающие

+ фильтрующие

# При авиационных катастрофах используются:

- противоракетные силы
- + аварийно-спасательные команды
- автобусы и троллейбусы

# К средствам индивидуальной защиты относятся:

- + радиозащитные
- химические
- биологические

# Когда был выделен вирус - возбудитель СПИДа?

- 1979 г.
- 1981 г.
- + 1983 г.
- 1985 г.
- 1989 г.

# Международное обозначение синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД):

- SIDA
- HIV
- + AIDS
- LAV

# В течение какого времени сохраняется активные свойства ВИЧ в высохшей капле крови при комнатной температуре:

- + в течение 7-10 дней
- инактивируется в течение 48 часов
- гибнет в течение нескольких минут
- в течение месяца

# Основными методами лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции в РФ являются:

- полимеразная цепная реакция (ПЦР)
- + иммуноферментный анализ (ИФА)
- высев вируса в культуру
- + реакция иммунного блотинга (ИБ)

# Какие биологические жидкости ВИЧ-инфицированного, представляют опасность для медицинских работников при выполнении ими профессиональных обязанностей:

- + кровь
- + гнойное отделяемое
- слюна
- + спинномозговая жидкость
- моча
- + лимфа
- + сперма

# Пути передачи ВИЧ-инфекции:

- + половой
- алиментарный
- + парентеральный
- + вертикальный

# ВИЧ-инфицированные являются контагиозными:

- на всех стадиях заболевания за исключением инкубационного периода
- + на всех стадиях заболевания
- только на стадии вторичных заболеваний

# Укажите контингенты лиц, у которых наиболее высок риск заражения ВИЧ-инфекцией:

- + реципиенты крови
- + наркоманы
- беременные
- + гомосексуалисты
- + проститутки

# Найдите верные определения термина ориентация:

- освещенность прямыми солнечным лучами здания, территории
- + расположение окон здания по сторонам света
- расположение жилых домов вдали от проезжей части улиц

# Биологическое действие ультрафиолетовых лучей:

- повышение обмена веществ
- стимуляция кроветворения

- синтез витамина d
- + все перечисленное верно

# Микроорганизмы-возбудители, образующие в почве споры:

- сибирской язвы
- газовой гангрены
- столбняка
- + все перечисленное верно

# Заражение ботулизмом возможно при употреблении следующих продуктов и блюд:

- капуста свежая
- + ветчина консервированная
- салат "оливье"
- орехи

# Условия, способствующие увеличению теплоотдачи путем испарения:

- + высокая температура и низкая влажность
- высокая скорость движения воздуха
- низкая температура и высокая влажность

# Пониженное содержание йода в питьевой воде и пище приводит:

- к кариесу
- к флюорозу
- + к эндемическому зобу
- к метагемоглобинемии

# Отметьте правильное утверждение:

- + токсикоинфекции могут возникнуть при массовой контаминации
- токсикоинфекции могут возникнуть при единичной контаминации

# Отметьте инфекционные заболевания, фактором передачи которых является воздух:

- + орви
- дизентерия
- + дифтерия
- + чума

# Наибольшее значение в загрязнении воздушной среды:

- + транспорт
- отопительные приборы и сооружения
- промышленные предприятия
- пожары

# Утомление - это процесс:

- + физиологический
- патологический

# Продолжительность мытья рук до и после любой манипуляции (в сек)

- 60
- 45
- 30
- + 15

# Уничтожение в окружающей среде патогенных микроорганизмов называется

- дератизацией
- + дезинфекцией
- стерилизацией
- дезинсекцией

# После использования резиновые перчатки подвергаются

- + дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации
- промыванию под проточной водой, стерилизации
- дезинфекции, стерилизации
- предстерилизационной очистке, стерилизации

# Дезинфекция ножниц, бритвенных приборов проводится

- + погружением в 70 град. спирт на 30 мин.
- погружением в 1% раствор хлорамина на 1 час
- протиранием спиртом
- кипячением 30 мин в воде

# При проведении процедур и манипуляций медсестра проводит обработку рук

- перед процедурой
- после всех процедур
- + в начале и в конце процедуры
- после нескольких процедур

# Раствор хлорамина, применяемый для дезинфекции мединструментов у

больных с вирусным гепатитом

- 10%
- 6%
- 5%
- + 3%

# Экспозиция при дезинфекции в 3% растворе формалина предметов, с которыми соприкасался больной гепатитом или СПИДом (в мин.)

- 90
- 45
- + 30
- 15

# Экспозиция при дезинфекции в 5% растворе хлорамина предметов, с которыми соприкасался туберкулезный больной (в мин.)

- + 240
- 180
- 90
- 60

# Для осмотра пациента применяют:

- стомат.зеркало и гладилку
- + стомат.зеркало и зонд
- шпатель и зеркало
- шпатель

# Зубные отложения удаляют:

- зондом
- штопфером
- пинцетом
- гладилкой
- + специальным набором крючков

# Для исследования патологических зубодесневых карманов используются:

- угловой зонд
- экскаватор
- гладилка
- + притупленный (пуговчатый) зонд с линейными делениями

# Эндодонтические инструменты предназначены для:

- препаровки зубов
- обработки полости зуба
- + работы в каналах
- работы в патологических зубодесневых карманах

# Выявление кариозных полостей осуществляется с помощью:

- экскаватора
- бора
- пинцета
- + зонда

# Зубы препарируют:

- дисками
- финирами
- полирами
- + борами

# Электроодонтодиагностика применяется для определения порога чувствительности:

- надкостницы
- + пульпы зуба и периодонта
- слизистой оболочки полости рта
- альвеолярного отростка

# Апекслокатор применяется для определения:

- + прохождения до верхушки корня
- выхода за верхушки корня
- непроходимости канала

# Замешивание пломбы производится с помощью

- + шпателя и стекла
- гладилки и стекла
- лопаточки и стекла
- смесителя

# Для удаления зубов нижней челюсти применяют щипцы:

- прямые
- + клювовидные
- S-образные
- штыковидные

# Для удаления резцов и клыков верхней челюсти применяют щипцы:

- + прямые
- прямой элеватор
- S-образные
- штыковидные

# Проток околоушной слюнной железы открывается напротив верхнего:

- первого премоляра
- клыка
- + второго моляра
- третьего моляра

# На спинке языка в основном располагаются сосочки:

- нитевидные
- + желобовидные
- листовидные
- грибовидные

# Сосуды и нервы содержатся в:

- + пульпе
- дентине
- корне
- эмали

# В молочном прикусе:

- 16 зубов
- + 22 зуба
- 20 зубов
- 30 зубов

# В постоянном прикусе:

- 28 зубов
- + 32 зуба
- 30 зубов
- 24 зуба

# Здоровые зубы реагируют на ток силой:

- + 2-6 мкА
- 100 мкА
- 50-60 мкА
- 300 мкА

# Стоматологические инструменты дезинфицируют в

- 6%-ном растворе перекиси водорода

- 5%-ном растворе хлорамина
- + 3%-ном растворе хлорамина
- 3%-ном растворе гипохлорида натрия

# Стерилизация металлического инструмента осуществляется в:

- автоклаве
- + сухожаровом шкафу (t - 180 град.С, 60 минут)
- сухожаровом шкафу (t - 160 град.С, 50 минут)
- кипячением

# К дополнительным методам обследования относится:

- опрос
- + рентгеновское обследование
- осмотр
- зондирование, перкуссия, пальпация

# Еда и питье перед дуоденальным зондированием:

- чай с молоком
- манная каша
- белый хлеб
- + ничего не есть и не пить

# Преимуществом парентерального пути введения является:

- + быстрота действия
- не требует специальной подготовки персонала
- не требует соблюдения стерильности
- простота и доступность

# Какое положение следует придать больному при анафилактическом шоке:

- + с опущенным головным концом, голову повернуть на бок
- с опущенным ножным концом, голову повернуть на бок
- горизонтальное
- полусидящее

# Заболевания, сопровождающиеся бронхоспазмом:

- + бронхиальная астма
- пневмония
- плеврит
- нефрит

# Под острой сосудистой недостаточностью подразумевается:

- сердечную астму
- + обморок
- отек легкого
- гипертонический кризис

# Какие симптомы являются истинными признаками биологической смерти:

- прекращение дыхания
- + появление трупных пятен
- + снижение температуры тела ниже 20°C
- + трупное окоченение

# Симптомы внутреннего кровотечения:

- повышение температуры
- гиперемия кожных покровов
- брадикардия
- + понижение артериального давления

# Симптомы, характерные для отека легких:

- + кашель с кровянистой пенистой мокротой
- + дыхание шумное, клакочущее
- + пульс частый
- + артериальное давление снижено

# В каком положении должны находиться руки реаниматора при проведении непрямого массажа сердца:

- + максимально разогнуты в лучезапястных и локтевых суставах
- слегка согнуть в локтевых суставах и максимально разогнуты в лучезапястных
- слегка согнуты в локтевых суставах и несколько разогнуты в лучезапястных

# Забирая кровь на биохимическое исследование, жгут следует снимать по окончании процедуры, перед извлечением иглы:

- + да
- нет

# Длина головки зубной щетки для детей должна быть:

- 23-30 мм
- 10-20 мм
- + 18-25 мм
- 30-40 мм

# Дети должны чистить зубы щетками:

- средней твердости
- + мягкими
- очень жесткими
- жесткими

# Людям со здоровым пародонтом рекомендуется чистить зубы методом:

- Леонарда
- + стандартным
- Фонеса
- Рейне

# При стандартном методе чистки зубов чистить начинают с движений:

- круговых
- горизонтальных
- + подметающих
- вертикальных

# Чистка зубов должна продолжаться:

- + 2,5-3,5 мин
- 1-2 мин
- 4-5 мин
- 0,5-1 мин

# Электрические зубные щетки рекомендуются:

- людям разного возраста
- детям
- пожилым
- + инвалидам и детям с недостаточной ловкостью

# Гигиенические зубные пасты оказывают действие:

- + очищающее, дезодорирующее
- противовоспалительное
- противокариозное
- противогрибковое

# Противокариозной пастой является:

- "Лесная"
- "Неопоморин"
- "Ягодка"
- + "Фтородент"

# К солевым зубным пастам относится:

- "Семейная"
- + "Поморин"
- "Пчелка"
- "Фтородент"

# При грибковом стоматите назначают пасту:

- мятную
- + бороглицириновую
- "Жемчуг"
- "Мери"

# Зубы необходимо чистить в день:

- + 2 раза
- 1 раз
- 3 раза
- после каждого приема пищи

# Ирригаторы используют для:

- снятия зубных камней
- + очистки полости рта и массажа десен
- снятия мягких зубных отложений
- обследования полости рта

# Профессиональную гигиену полости рта проводят:

- терапевты
- сами пациенты
- сангигиенисты
- + стоматологи

# Межзубные промежутки чистят:

- + межзубными стимуляторами
- межзубными эликсирами
- зубочистками, зубными нитями
- ирригаторами

# Эликсиры назначают:

- до еды

- перед чисткой зубов
- + после еды
- после чистки зубов

# Для оценки гигиенического состояния полости рта используют чаще индекс:

- + Федорова-Володкиной
- Грина-Вермилиона
- Шиллера-Писарева
- ПМА

# Профилактика кариеса у ребенка должна начинаться в периоде:

- новорожденности
- + ясельного возраста
- внутриутробного развития
- дошкольного возраста

# Для профилактики кариеса зубы покрывают ортолаком в год:

- 2 раза
- 5 раз
- 3 раза
- + 4 раза

# Герметизация фисур первых постоянных моляров осуществляется в возрасте:

- 7 лет
- 8 лет
- + 5,5-6,5 лет
- 9-11 лет

# Для профилактики некроза зубов необходимо:

- своевременное лечение зубов
- + полоскать полость рта содовым раствором
- покрыть фторлаком
- назначить внутрь препараты кальция

# Для профилактики местной гипоплазии необходимо:

- принимать препараты тетрациклина
- чистить зубы 2 раза в день
- проводить аппликации 10%-ным раствором глюконата кальция
- + своевременно лечить или удалять молочный зуб

# Профилактика ормоороза должна начинаться с:

- + момента рождения до окончания сроков минерализации эмали
- 4-5 лет
- 2-3 лет
- 7-8 лет

# При наличии клиновидного дефекта необходимо чистить зубы, исключая движения щеткой,:

- вертикальные
- круговые
- + горизонтальные
- подметающие

# Профилактика заболеваний пародонта во многом сходна с профилактикой:

- + кариеса зубов
- некариозных поражений
- заболеваний слизистой оболочки полости рта
- аномалий зубочелюстной системы

# Основным направлением профилактики аномалий зубочелюстной системы является:

- рациональное питание беременной
- рациональная гигиена полости рта беременной
- лечение зубов беременной
- + устранение влияния на плод вредных факторов в первые месяцы беременности

# Ребенка необходимо обучать чистить зубы с:

- 5 лет
- 4 лет
- + 2,5-3 лет
- 6 лет

# После устранения раздражителей при кариесе боли:

- + исчезают
- усиливаются
- держатся 20 мин
- не прекращаются 30 мин

# Для уточнения диагноза стадии пятна применяют окрашивание раствором:

- йода
- + 2% раствором метиленовой синью
- Люголя

# Выбухание грануляционной ткани из полости зуба характерно для:

- хронического гангренозного пульпита
- острого очагового пульпита
- + хронического гипертрофического пульпита
- хронического фиброзного пульпита

# Для некротизации пульпы используют препарат:

- йод
- + мышьяковистую пасту
- камфору
- капсорофенол

# Основной причиной возникновения периодонтита является:

- + инфекция
- вредные привычки
- воздействие внезапного удара
- аллергическая реакция

# При хроническом фиброзном периодонтите жалобы на:

- + боли отсутствуют
- постоянные пульсирующие боли
- кратковременные самопроизвольные боли
- усиление болей при надкусывании

# При хроническом гранулематозном периодонтите на рентгенограмме имеется:

- неравномерное расширение периодонтальной щели в основании верхушки корня
- + деструкция костной ткани округлой четкой формы в области верхушки корня
- деструкция костной ткани без четких границ
- снижение высоты межальвеолярной перегородки

# Наличие свищевого хода характерно для:

- фиброзного периодонтита

- + гранулематозного периодонтита
- гранулирующего периодонтита
- гангренозного пульпита

# Переостит - это воспаление

- + надкостницы
- пародонта
- кости
- переодонта

# Периодонтит - это воспаление

- пульпы
- десневого сосочка
- + периодонта
- надкостницы

# При периодонтитах физиотерапевтическое лечение назначается:

- при нарастании явлений воспаления
- при хроническом воспалении
- в острой стадии
- + после снятия острого воспаления в периодонии

# Деструкция костной ткани межальвеолярных перегородок характерна для:

- гингивита
- стоматита
- + пародонтита
- механической травмы слизистой

# При хроническом катаральном гингивите десна:

- бледная
- + гиперемированная с цианотическим оттенком
- гиперемированная
- бледно-розовая

# . При язвенно-некротическом гингивите характерно:

- зуд в деснах
- + гнилостный запах
- разрастание десневых сосочков

# При гипертрофическом гингивите фиброзной формы цвет десен:

- + не изменен
- красный
- цианотичный
- ярко-красный

# Подвижности зуба характерна для:

- пародонтоза
- стоматита
- + парадонтита
- гингивита

# Кюретаж зубодесневых карманов проводят при:

- хроническом катаральном гингивите
- пародонтозе
- + парадонтите I степени
- парадонтолизе

# Ощущение жжения в полости рта возникает при:

- поражении горячим паром
- + наличии в полости рта разнородных металлов
- острой хронической травме
- хронической и механической травме

# При ожоге слизистой оболочки полости рта щелочью применяют полоскания:

- + лимонной водой
- йодиолом
- содовым раствором
- раствором перманганата калия

# Хронический рецидивирующий герпес проявляется у людей ... возраста

- + разного
- подросткового
- грудного
- пожилого

# К первичным элементам относятся:

- + эритема
- сыпь
- афта
- разрез

# К вторичным элементам относятся:

- + корка
- бляшка
- пигментация
- родинка

# Первичным элементом поражения при хроническом рецидивирующем герпесе является:

- эрозия
- корочка
- + пузырек
- язва

# Постоянным симптомом скарлатины является:

- сильный отек губ
- пятна темно-пурпурного, красного цвета
- + "пылающий зев"
- люпомы

# Новорожденные дети заражаются кандидозом через:

- игрушки
- пищу
- + родовые пути матери
- контакт с другими детьми

# Белые творожистые высыпания на слизистой характерны для:

- + кандидоза
- актиномикоза
- язвенно-некротического стоматита
- парадонтита

# Применение тетрациклина во второй половине беременности вызывает развитие гипоплазии:

- очаговой и местной
- очаговой
- местной
- + системной

# Допустимая концентрация фтора в питьевой воде составляет:

- 2 мг/литр
- + 1 мг/литр

- 4 мг/литр
- 0,5 мг/литр

# При кислотном некрозе больной ощущает:

- постоянно ноющие боли в зубе
- + чувство оскотины
- длительную боль от холода
- длительную боль от горячего

# Очаг поражения твердых тканей при клиновидном дефекте:

- + гладкий, плотный, блестящий
- шероховатый и светлый
- мягкий
- темный

# Предрасполагающим фактором для развития кандидоза являются:

- термические поражения
- химические поражения
- наличие разнородных металлов во рту
- + длительный прием антибиотиков

# Первые постоянные моляры прорезываются в возрасте:

- + 6 лет
- 7-8 лет
- 8-9 лет
- 10-11 лет

# Озлокачествляться могут язвы при:

- + хронической механической травме слизистой
- язвенном гингивите
- сифилисе
- туберкулезе

# Свинцовый стоматит характеризуется:

- + металлическим привкусом и запахом изо рта
- серовато-белым налетом и зловонным запахом
- повышенным ороговением слизистой оболочки губ, щек и десен

# Физиологический прикус:

- ортопедический
- + ортогнатический
- открытый
- прогенический

# Воспалительный процесс, развивающийся в костном мозге с гнойно-некротическим процессом, это:

- переостит
- + остеомиелит
- перикоронарит

# Прогрессирующая чашеобразная убыль эмали и дентина это:

- язва твердых тканей
- + эрозия твердых тканей
- гиперплазия
- некроз твердых тканей

# К заболеваниям, в основе которых лежат расстройства иммунной системы, относится:

- лейкоплакия
- + красная волчанка
- кандидоз
- пузырчатка

# Воспалительный процесс, возникающий при затрудненном прорезывании третьего большого коренного зуба (моляра):

- переостит
- + перикоронарит
- остеомиелит
- ольвеолит

# Шейки зубов обнажаются при:

- стоматите
- кандидозе
- + парадонтозе
- хроническом гипертрофическом гингивите

# Медработник должен ежемесячно проводить санитарно-просветительную работу:

- 7 часов
- 2 часа
- + 4 часа
- 3 часа

# Темы санитарного просвещения должны быть рассчитаны на:

беременных  
неорганизованное население  
организованное население  
+ конкретную аудиторию

# Класс гигиены рассчитан на:

- 30-40 учащихся  
- 50-60 учащихся  
+ 15-20 учащихся  
- 20-30 учащихся

# Санпросвет. работу следует начинать с:

- школьников  
- студентов  
- дошкольников  
+ родителей и воспитателей

# Обучение гигиеническим навыкам детей в возрасте 2-3 года строится в виде:

- лекции  
- беседы  
+ игры  
- урока

# Для детей в возрасте 3-4 года гигиеническое воспитание лучше проводить в виде:

- выступления  
+ сказки, рассказа  
- лекции  
- беседы

# При оформлении медицинской карты стоматологического больного необходимо указать:

- ИНН  
+ № страхового медицинского полиса  
- № страхового свидетельства  
- № талона к врачу

# В стоматологических поликлиниках прием пациентов осуществляется:

- по вызову  
- на дому  
- по обращаемости

+ по обращаемости и дифференцированно

# Где проводятся мероприятия по проведению профессиональной гигиены полости рта:

- в комнатах гигиены  
+ в лечебных кабинетах  
- ортопедических кабинетах  
- ортодонтических кабинетах

# Для проведения профилактических мероприятий по гигиеническому обучению идеальным местом служат:

+ комнаты гигиены  
- классы в школах  
- группы в яслях  
- комнаты в клубах

# Основным звеном, ведущим профилактическую работу, в стоматологии являются:

+ гигиенисты  
- стоматологи  
- хирурги

# Целью первичной профилактики кариеса является:

+ предупреждение возникновения кариозного процесса  
- своевременное лечение кариозного процесса  
- ранняя диагностика кариозного процесса

# Целью вторичной профилактики кариеса является:

- предупреждение возникновения кариозного процесса  
- своевременное лечение кариозного процесса  
+ ранняя диагностика кариозного процесса

# Целью третичной профилактики кариеса является:

- предупреждение возникновения кариозных поражений  
+ лечение существующих кариозных поражений

- ранняя диагностика кариозных поражений

# Зуб, находящийся в линии перелома:

- фиксируют проволокой
- + удаляют
- оставляют
- удаляют и реплантируют

# При двухстороннем переднем вывихе

- + рот открыт
- рот закрыт
- подбородок смещен в здоровую сторону
- подбородок смещен в сторону больного сустава

# Кровотечение из поверхностной височной артерии останавливают прижатием

- позади ушной раковины
- + впереди ушной раковины
- к поперечному отростку VI шейного позвонка
- к поперечному отростку VII шейного позвонка

# Клинические проявления наследственных аномалий:

- расщелины верхней губы
- расщелины альвеолярного отростка
- + диастема
- расщелины мягкого неба

# Клинические проявления врожденных аномалий:

- + расщелины мягкого неба
- диастема
- адентия
- сверхкомплектные зубы

# Первичная хирургическая обработка раны должна проводиться в первые:

- 12 часов
- 6 часов
- 48 часов
- + 24 часа

# Виды несъемных протезов:

- + вкладки
- пластиночные
- бюгельные

+ штифтовые

# Виды съемных протезов:

- + бюгельные
- коронки
- мостовидные
- полукоронки

# Виды временных шин при заболевании пародонта:

- + капповые
- протезы
- колпачковые шины
- шины Копейкина

# Виды постоянных шин при заболевании пародонта:

- капповые
- проволока
- + многосвязные кламмеры
- колпачковые шины

# При раке языка жалобы на:

- жжение в языке
- сухость
- покраснение
- + боль во время еды, разговора, иррадиирующая боль в ухо, в зубы нижней челюсти

# Лечение рака нижней челюсти должно быть:

- консервативное
- хирургическое
- лучевое
- + комбинированное

# Атерома - это:

- врожденная ограниченная дисплазия кожи
- жировик
- разрастание на слизистой оболочке
- + ретенционная киста сальной железы
- кости

# При вскрытии очагов на лице учитывают расположение:

- лицевой артерии
- челюстной артерии
- ветвей тройничного нерва
- + ветвей лицевого нерва

# При абсцессах и флегмонах основным лечебным мероприятием является:

- лечение антибиотиками
- лечение сульфаниламидами
- удаление зуба
- + вскрытие гнойного очага

# Осложнение при шоке:

- + продолжительная и значительная боль
- острая недостаточность кровеносных сосудов
- большая потеря крови
- острая сердечная недостаточность

# Назовите основные симптомы остановки сердца:

- отсутствие пульса на периферических сосудах
- + отсутствие пульса на центральных сосудах
- расширение зрачков
- сужение зрачков

# Назовите общие симптомы кровотечения:

- одышка
- падение давления
- + бледность кожных покровов
- + головокружение

# Назовите основные причины анафилактического шока:

- переохлаждение
- контакт с инфекционным больным
- + впервые примененное лекарство
- повторное введение лекарства

# Комплекс мер по предупреждению попадания микробов в рану при медицинских манипуляциях:

- асептика
- + антисептика
- заключительная дезинфекция
- текущая дезинфекция

# Дезинфекция уничтожает:

- + все виды жизнедеятельности микробов
- только вегетативные формы микробов

# Можно ли хранить стерильные медицинские инструменты в 70 град.этиловом спирте с целью сохранения стерилизации?

- + нельзя, так как этот способ не оказывает стерилизирующее действие
- можно во всех ЛПУ без исключения
- можно только на фельдшерско-акушерских пунктах

# Перчатки, загрязненные кровью, обрабатываются в ходе работы:

- 3% раствором хлорамина
- + 1% раствором хлорамина
- 0,5% раствором хлорамина

# Дезинфекция использованных одноразовых шприцев проводится:

- + в процедурном кабинете
- в кабинете старшей медсестры
- в центральной стерилизационной

# Средняя продолжительность инкубационного периода при ВИЧ-инфекции:

- от 2 до 3 недель
- от 3 до 4 недель
- + от 3 недель до 3 месяцев
- от 3 до 6 месяцев

# ВИЧ-инфицированным:

- оказывается только неотложная медицинская помощь
- оказываются все виды медицинской помощи только в инфекционном стационаре
- + оказываются все виды медицинской помощи на общих основаниях